

KEDVENC LENDÜLET / MOZGÁSBAN

Sportolás kezdőknek és újrakezdőknek

Gyakorlati kisokos a biztonságos és fenntartható kezdéshez

A kisokos segít abban, hogy

biztonságosan indulj el és felismerd, mikor kérj segítséget

a terhelést fokozatosan, a saját szintedhez igazítsd

változatos, élvezhető heti rutint építs

reálisan kezeld a vitaminokat és táplálékkiegészítőket

A legfontosabb: nem kell rögtön elérned a heti ajánlást. Kezdd annyival, amennyi most biztonságosan megy, majd lépésről lépésre építsd fel a rendszerességet.

Mozdulj el a nulláról. Ne a tökéletességet üldözd.

1 Indulás előtt

A közepes intenzitású mozgás a legtöbb egészséges felnőtt számára biztonságos. Ha azonban régóta inaktív vagy, erős intenzitású edzésbe kezdenél, vagy ismert betegséged van, érdemes előzetesen orvossal egyeztetned.

Mikor egyeztess szakemberrel

- szív- és érrendszeri, légzőszervi, anyagcsere- vagy vesebetegség esetén;
- kezeletlen magas vérnyomás, cukorbetegség vagy jelentős mozgásszervi panasz mellett;
- várandósság, friss műtét, sérülés vagy hosszabb betegség után;
- ha terhelésre mellkasi fájdalom, szokatlan légszomj, ájulásérzés vagy szabálytalan szívdobogás jelentkezett;
- ha gyógyszered befolyásolhatja a pulzust, a vérnyomást vagy a vércukorszintet.

Azonnal állj meg és kérj segítséget

Figyelmeztető jel	Teendő
Mellkasi nyomás vagy fájdalom	Állj meg. Ha nem múlik gyorsan, erős, vagy rosszulléttel jár, kérj sürgős segítséget.
Szokatlan nehézlégzés, ájulás, zavartság	Ne folytasd az edzést; kérj segítséget.
Hirtelen erős fájdalom, deformitás, terhelhetetlenség	Kíméld az érintett testrészt és kérj egészségügyi tanácsot.
Láz, hányás, hasmenés, mellkasi hurut	Pihenj; teljes felépülés után fokozatosan térj vissza.

Fontos: az izomfáradás, a gyorsabb légzés és az enyhe izomláz lehet természetes. Az éles, fokozódó fájdalom, a rosszullét és a neurológiai tünet nem az.

2 A jó kezdés képlete

Az első cél ne a teljesítmény legyen, hanem az, hogy a mozgás rendszeres és ismételhető maradjon. Olyan edzést válassz, amely után egy-két nappal újra képes lennél mozogni.

Lépés	Mit tegyél
1 Válassz könnyű formát	Séta, kerékpár, úszás, könnyű torna vagy egyszerű erősítő gyakorlatok.
2 Foglalj időpontot	Hetente 2-3 rövid, konkrét időpont kerüljön a naptáradba.
3 Kezdd röviden	10-20 perc is értékes. Ha szükséges, bontsd 5-10 perces részekre.
4 Maradj beszédképes	Közepes intenzitásnál tudsz mondatokban beszélni, de énekelni már nehéz.
5 Jegyezd fel	Idő, mozgásforma, terhelésérzet és közérzet - ennyi elég.

3 Négyhetes újrakezdő minta

Ez egy egészséges felnőttnek szánt, rugalmas példa. Ha most ennél kevesebb megy, csökkentsd az időt; ha könnyű, először az időtartamot növel, és csak később az intenzitást.

Hét	Állóképesség	Erősítés	Mobilitás és pihenés
1.	3 × 15-20 perc könnyű séta vagy kerékpár	1 × 15 perc, 1 sorozat/gyakorlat	Edzésnapok között pihenőnap
2.	3 × 20-25 perc, többnyire könnyű tempó	2 × 15-20 perc	5-8 perc mobilitás 2-3 napon
3.	3 × 25-30 perc; rövid tempós szakaszok	2 × 20 perc, 1-2 sorozat	Legalább 1 teljes pihenőnap
4.	3-4 × 25-35 perc, változatos útvonal	2 × 20-25 perc	Terhelésértékelés és következő terv

Egyszerű teljes testes erősítő kör

Gyakorlat	Kezdő változat	Adag
Guggolás	Leülés és felállás stabil székről	6-12 ismétlés
Tolás	Fekvőtámasz falnál vagy magas támaszon	6-12 ismétlés
Húzás	Gumiszalagos evezés	8-12 ismétlés
Csípő	Csípőemelés hanyatt fekve	8-12 ismétlés
Törzs	Madár-kutya vagy rövid plank könnyített helyzetben	oldalanként 5-8
Vádli és egyensúly	Sarokemelés, majd egylábas állás kapaszkodva	8-15 / 20-30 mp

Mozogj kontrolláltan, ne tartsd vissza a levegőt, és hagyd még 2-3 szabályos ismétlést „a tartalékban”. Fájdalmas gyakorlatot ne erőltess; válassz könnyebb változatot.

4 A fokozatosság elve

Egyszerre csak egy fő változót emelj: a gyakoriságot, az időtartamot, az intenzitást vagy az ellenállást. Nincs mindenre érvényes kötelező százalékos növelési szabály; a közérzet, a regeneráció és a mozgásminőség fontosabb.

- ☐ A következő edzés előtt a szokatlan izomfájdalom nagyrészt elmúlt.
- ☐ Az előző terhelés után az alvásom és a napi energiaszintem rendben volt.
- ☐ A gyakorlatokat végig szabályosan, kontrolláltan tudtam végezni.

- ☐ Nem jelentkezett ízületi fájdalom vagy rosszullét.
- ☐ A jelenlegi adag legalább két alkalommal kezelhetőnek érződött.

Ha több pont nem teljesül: ne emelj a terhelésen. Tarts könnyebb hetet, rövidíts, vagy kérj szakmai segítséget.

5 Milyen intenzitással mozogj

Szint	Beszédteszt	Terhelésérzet 0-10	Mikor használd
Könnyű	Kényelmesen beszélsz	2-3	Bemelegítés, levezetés, kezdő edzések
Közepes	Mondatokban beszélsz, énekelni nehéz	4-6	Az edzések nagy része
Erős	Csak néhány szót mondasz	7-8	Később, rövid szakaszokban
Nagyon erős	Beszéd alig lehetséges	9-10	Kezdőként nem szükséges

A pulzusóra hasznos visszajelzés lehet, de nem orvosi műszer, és az életkoron alapuló képletek csak becslések. Kezdőként a beszédteszt és a terhelésérzet sokszor praktikusabb.

6 Bemelegítés és levezetés

Bemelegítés 5-10 perc

- indíts lassú sétával, tekeréssel vagy helyben járással;
- mozgasd át azokat az ízületeket, amelyeket terhelni fogsz;
- végezz 1-2 könnyű gyakorló sorozatot az erősítő gyakorlatokból;
- a tempót fokozatosan emeld, ne hidegen kezdj intenzív szakasszal.

Levezetés 5-10 perc

- fokozatosan lassíts, amíg a légzés rendeződik;
- igyál a szomjúságodnak és a körülményeknek megfelelően;
- a nyújtás legyen kíméletes, ne fájdalmas és ne rugózó.

7 Így tedd változatossá

A változatosság nem azt jelenti, hogy minden edzés teljesen más. Tarts meg néhány stabil alapelemet 4-6 hétig, és ezek köré építs kisebb változtatásokat.

Cél	Lehetséges választások
Állóképesség	Séta, túra, kerékpár, úszás, tánc, evezőpad
Erő	Saját testsúly, gumiszalag, kézisúlyzó, gépek
Mobilitás	Ízületi átmozgatás, jóga, könnyű mobilitási rutin
Egyensúly	Egylábás állás, tai chi, irányváltások, lépcsőzés
Közösség	Páros séta, csoportos óra, csapatsport, közös kihívás

Praktikus módszer: legyen egy „A terv” és egy rövidebb „B terv”. Ha nincs időd 30 percre, végezz 10-15 percet. A rövid edzés nem kudarc, hanem a folytonosság védelme.

8 Regeneráció és sérülésmegelőzés

- Ugyanazt az izomcsoportot ne terheld minden nap keményen.
- A cipő legyen kényelmes és a mozgásformához illő; drága felszerelés nem feltétel.
- Új terep, hosszabb táv vagy nagyobb súly fokozatosan kerüljön be.
- Aludj lehetőség szerint rendszeresen; a fáradtság rontja a mozgásminőséget és a döntéseket.
- Tartós vagy romló fájdalomnál ne csak „edzd át”; vizsgáld ki.

Izomláz vagy sérülés

Valószínű izomláz	Sérülésre utalhat
Tompább, kétoldali izomérzékenység	Éles, pontszerű vagy hirtelen fájdalom
Gyakran 12-48 órával később erősödik	Duzzanat, instabilitás, mozgásbeszűkülés
Könnyű mozgásra általában enyhül	Terhelésre fokozódik vagy sántítást okoz
Néhány nap alatt javul	Nem javul, visszatér vagy éjszaka is erős

9 Étkezés és folyadék

A kezdő sportolás eredményét elsősorban a rendszeres mozgás, a megfelelő energia- és tápanyagbevitel, az alvás és a regeneráció határozza meg. A legtöbb, egy óránál rövidebb, közepes edzéshez nincs szükség külön sportitalra vagy edzés előtti készítményre.

- Egyél változatosan: zöldség, gyümölcs, teljes értékű gabona, megfelelő fehérjeforrás és jó minőségű zsiradék legyen rendszeresen az étrendben.
- Minden főétkezésben legyen fehérjeforrás, különösen erősítő edzés mellett.
- Edzés előtt válassz jól tolerálható ételt; közvetlenül előtte kerül a nagy, zsíros vagy szokatlan fogást.
- Edzés után nincs kötelező „30 perces ablak”; a napi összbevitel és a rendszeresség fontosabb.
- Igyál rendszeresen, melegben és erős izzadásnál többet. Ne erőltesd a túlzott folyadékfogyasztást.
- Elektrolitital inkább hosszabb, melegben végzett vagy nagy izzadással járó terhelésnél lehet indokolt.

10 Vitaminok és táplálékkiegészítők

A táplálékkiegészítő nem a kezdés feltétele, és nem helyettesíti a változatos étrendet. Hiányállapot gyanújánál orvosi vizsgálat és szakmai tanács a jó első lépés. A termékek hatóanyaga kölcsönhatásba léphet gyógyszerekkel, és a több összetevős sportkészítmények minősége változó lehet. [3-5]

Készítmény	Mikor lehet értelme	Mire figyelj
Fehérjepor	Kényelmi megoldás, ha ételből nehéz fedezni a szükségletet	Nem kötelező; számít a napi teljes bevitel, allergia és tolerancia.
Kreatin monohidrát	Erősítő vagy ismételt nagy intenzitású edzés teljesítményét támogathatja	Kezdőként opcionális. Gyakori fenntartó adag 3-5 g/nap; vesebetegség, várandósság, szoptatás vagy gyógyszeresedés esetén előbb szakember.
D vitamin	Igazolt hiány, kevés napfény vagy orvosi javaslat esetén	Az adag egyéni; a túlzott bevitel ártalmas lehet. Ne alkalmazz tartósan nagy adagot kontroll nélkül.
Vas	Laborral igazolt hiány vagy orvosi javaslat esetén	Rutinszerűen ne szedd: túlادagolható, és a hiány okát is tisztázni kell.

Készítmény	Mikor lehet értelme	Mire figyelj
Magnézium	Igazolt hiány vagy célzott szakmai javaslat esetén	Az izomgörcsöt nem mindig hiány okozza; nagyobb adag hasmenést okozhat.
Elektrolit	Hosszú, melegben végzett, erős izzadással járó terhelésnél	Rövid, könnyű edzéshez többnyire víz és normál étrend elég.

Amit kezdőként inkább kerülj

- „zsírégető” vagy gyors fogyást ígérő termékek;
- magas koffeintartalmú és sok összetevős edzés előtti formulák;
- ismeretlen eredetű, pontos hatóanyag-mennyiséget nem közlő készítmények;
- egymással átfedő multivitaminok és megadózisok;
- bármely készítmény, amelyet gyógyszer mellett szakmai ellenőrzés nélkül kezdenél el.

Vásárláskor: ellenőrizd az összetevőket és az adagokat, keress független minőségellenőrzést, és versenysport esetén kizárólag doppingkockázat szempontjából bevizsgált terméket válassz.

11 Heti tervező

Tervezz előre, de hagyd mozgásteret. A pihenés is a terv része.

Nap	Tervezett mozgás	Idő	Terhelés 0-10	Utána hogy éreztem magam
Hétfő				
Kedd				
Szerda				
Csütörtök				
Péntek				
Szombat				
Vasárnap				

Heti visszatekintés

- ☐ Mi ment könnyen, és mit szeretnék megtartani?
- ☐ Mi akadályozott, és hogyan készíthetek hozzá B tervet?
- ☐ Jól regenerálódtam, vagy könnyebb hétre van szükségem?
- ☐ Mi legyen a következő hét egyetlen apró előrelépése?

12 Gyakori kérdések

Kell-e minden edzésen izzadnom?

Nem. Az izzadás függ a hőmérséklettől, az egyéni adottságoktól és a ruházattól; nem pontos mércéje az edzés minőségének.

Elég a séta?

Igen, a tempós séta kiváló kezdés. Később egészítsd ki heti legalább két erősítő alkalommal, és fokozatosan közelíts az általános ajánláshoz. [1]

Mikor látszik eredmény?

A közérzet és az alvás hamarabb javulhat, míg az állóképesség, erő és testösszetétel változása több hetet vagy hónapot igényelhet. A trendet nézd, ne egyetlen napot.

Mi történjen, ha kimarad egy hét?

Ne próbáld egyszerre bepótolni. Térj vissza egy könnyebb alkalommal, majd néhány edzés alatt építsd vissza a korábbi szintet.

13 Hosszabb távú cél

A WHO felnőtteknek hetente 150-300 perc közepes intenzitású vagy 75-150 perc erős intenzitású aerob mozgást, illetve legalább két napon izomerősítést javasol. Idősebb korban az egyensúlyt fejlesztő mozgás is különösen fontos. Bármennyi mozgás jobb a semminél, és az ülőidő csökkentése is számít. [1]

Ezt ne első heti kötelezettségként kezeld. A cél az, hogy biztonságosan, hónapokon át fenntartható módon közelíts hozzá.

14 Indulás előtti ellenőrzőlista

- ☐ Olyan mozgásformát választottam, amelyet szívesen végzek.
- ☐ Ismerem azokat a tüneteket, amelyeknél abba kell hagynom az edzést.
- ☐ Van kényelmes ruházatom, megfelelő cipőm és biztonságos helyem.

- ☐ A következő hétre kijelöltem 2-3 reális időpontot.
- ☐ Az első edzésem szándékosan könnyű lesz.
- ☐ Van rövid B tervem arra az esetre, ha kevés időm vagy energiám lenne.
- ☐ Nem akarok egyszerre mindent megváltoztatni.
- ☐ Ha szükséges, egyeztettem orvossal vagy megfelelő szakemberrel.

Források és szakmai háttér

A kisokos általános tájékoztatásra szolgál, nem helyettesít orvosi vizsgálatot, diagnózist, gyógytornát vagy egyéni edzés tervezést.

- [1] World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour; Physical activity fact sheet. [who.int](https://www.who.int)
- [2] U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Adding Physical Activity as an Adult; Adult Activity: An Overview. [cdc.gov](https://www.cdc.gov)
- [3] NIH Office of Dietary Supplements. Dietary Supplements for Exercise and Athletic Performance. ods.od.nih.gov
- [4] NIH Office of Dietary Supplements. Vitamin D, Iron, Magnesium and other dietary supplement fact sheets. ods.od.nih.gov
- [5] U.S. Department of Health and Human Services, Nutrition.gov. Dietary Supplements for Athletes. [nutrition.gov](https://www.nutrition.gov)
- [6] NHS. Exercise and physical activity guidance for adults. [nhs.uk](https://www.nhs.uk)

Szakmai lezárás dátuma: 2026. szeptember 26.